Растителна защита

електронно списание за растителна защита
семена, торове и земеделие
ISSN 2815-522X

Третото десетдневие на юни – екстремно високи максимални температури, риск за градушки и полягане на узрелите житни посеви

Растителна Защита

Дата 02.06.2026 | **Брой** 6/2026 | **ISSN** 2815-522X | **Език** BG
www.plant-protection.com/article/2424?lang=bg



През следващия седемдневен период (29.05.-04.06.2026 г.) агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време. Развитието на земеделските култури ще се осъществява при температури близки до климатичната норма и при наличие на оптимални почвени влагозапаси, вследствие падналите значителни валежи през май и надвишили в по-голямата част от полските райони месечната норма.

През периода при зимните житни култури ще протича наливане на зърното и фаза млечна зрелост, предимно при посевите в източните и южните райони - Сандански, Търговище, Силистра, Провадия и Карнобат.



Житните дървеници (Eurygaster integriceps Put.) повреждат стъблата на житните растения, зърното, в резултат на което се понижава количеството и се влошава качеството му. В повредените зърна се съдържа по-малко количество глутен, полученото брашно е с влошени хлебопекарни качества, поради което хлябът е сбит. https://www.plant-protection.com/bg/article/2277?lang=bg

В края на май и началото на юни повреди по пшеницата нанасят ларвите на житната дървеница, което изисква обследване на посевите и при плътност на вредителя над прага на икономическа вредност (2бр. ларви/m²) е необходимо при първа възможност да се извърши третиране.

ВИКСЕРАН: Естествена сила и устойчив добив при царевицата

През периода при царевицата и слънчогледа ще протича листообразуване. При засетите в агротехнически срок посеви със слънчоглед в крайните южни райони ще се наблюдава и начало на фаза формиране на съцветие.



Брашнеста мана Oidium tuckeri. Високата атмосферна влажност и трайното затопляне на времето през месеца са предпоставки за развитието на болестта. https://www.plant-protection.com/article/1802?lang=bg

При лозата ще се осъществява цъфтеж на ресите - критична фаза за заразяване с оидиум.



Симптоми на фузариоза по класовете на пшеницата. https://www.plant-protection.com/article/1780?lang=bg

Честите валежи през периода ще създават условия за развитие на болести: фузариоза по пшеницата, късно кафяво гниене по плодовете на зреещите череши, сиво гниене по ягодите. Съществува висок риск за градушки и полягане на пшеничните посеви.

В началото на лятото се прогнозират екстремно високи максимални температури, на места в Горнотракийската низина до 37-38°C. Тези стойности ще имат негативно въздействие върху фертилността на полена и формирането на репродуктивните органи при зеленчуковите култури (градински фасул, домати, пипер, краставици, тиквички и др.).

През периода при царевицата ще протича листообразуване. В края на периода при ранните хибриди царевица в южните райони ще се наблюдава и фаза изметляване.



Царевичният стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis Hübner) е един от основните вредители по царевицата в Европа, Азия и Америка. Масовото отглеждане на царевица в Европа е допринесло за бързото му разпространение. Ежегодно загубите причинени от неприятеля и разходите за борба с него надхвърлят един милиард долара

През третото десетдневие на юни царевичните посеви трябва да се обследват за наличие на един от най-опасните вредители - царевичният стъблопробивач и при плътност над ПИВ (10 броя яйчни купчинки на 100 растения) е необходимо своевременно третиране срещу младите ларви, преди вгризването им в стъблата.

Царевичният стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis Hübner) – важен икономически неприятел по царевица

През периода при слънчогледа ще протича формиране на съцветие. При част от посевите на места в Дунавската равнина и в югоизточните ра-

йони в края на юни ще се наблюдава и начало на фаза цъфтеж. Рапицата е във фаза узряване. При пшеницата и ечемика в полските райони ще се наблюдавамасово восъчна и пълна зрелост, а във високите полета - млечна и преход към восъчна зрелост.

През периода в Западна и Централна България се прогнозират градушки, риск за полягане на узрелите житни посеви и разпиляване на зърното.

В източните и южните райони на страната валежи не се очакват и условията ще позволяват провеждане на най-важното мероприятие – жътвата на пшеницата.



Снимка: МЗХ

На 17 юни беше даден официален старт на жътвената кампания 2026 от министъра на земеделието и храните Пламен Абровски в с. Дренов, област Ловеч. „Добрата реколта никога не е случайност, а е резултат от професионализъм, всеотдайност и отговорност към българската земя”, каза министър Абровски по време на церемонията.



Снимка: МЗХ

В събитието, част от инициативата „Златна жътва - Ловеч 2026“, участие взеха и президентът на Република България Илияна Йотова, кметът на Ловеч Страцимир Петков, областният управител Пламен Христов, председателят на Комисията по земеделие, храни и гори към 52-то Народно събрание Явор Гечев, народни представители, изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Владислава Казакова, председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов и земеделски производители от района.

По данни на МЗХ, през тази година прогнозното производство от реколта 2026 се очаква да бъде между 6,5 и 6,8 млн. тона пшеница и малко над 1 млн. тона ечемик.