Растителна защита

електронно списание за растителна защита
семена, торове и земеделие
ISSN 2815-522X

През юли агрометеорологочните условия ще се определят от относително сухо и горещо време, което е предпоставка за топлинен стрес при земеделските култури

Растителна Защита

Дата 02.07.2026 | **Брой** 7/2026 | **ISSN** 2815-522X | **Език** BG
www.plant-protection.com/article/2437?lang=bg



В края на месец юни и началото на юли развитието на земеделските култури ще протича при наднормени температури и на много места в източните и югоизточните райони при формиращ се дефицит на влага в 50cm почвен слой. Ниски, под 65% от ППВ, са почвените влагозапаси при пролетните култури в част от североизточните райони (агростанциите Разград, Силистра). В западните и централните райони, след падналите валежи през третото десетдневие на юни настъпи подобрение на почвените влагозапаси -от важно значение за пролетните култури, част от които са в репродуктивен стадий на развитие, с повишени изисквания към влагата в почвата.



В началото на юли при слънчогледа във високите полета ще се наблюдава формиране на съцветие, а в полските райони - начало на фаза цъфтеж. При царевицата, в зависимост от ранозрелостта и, ще протичат различни фази: листообразуване, изметляване и цъфтеж на метлицата, предимно при ранните хибриди. През периода прогнозираните

високи максимални температури, от порядъка на 37-38°C, ще имат неблагоприятно въздействие върху цъфтежа и оплождането при пролетните култури.



При сухо и топло време популационната плътност на червеният овощен акар се повишава. През лятото развива няколко генерации, в резултат на което върху растенията се натрупва голямо количество от неприятеля. При много висока плътност или конкуренция с други видове тетранихови акари, подвижните форми (ларви, нимфи и възрастни) на червения овощен акар може да преминат и да смучат сок и от горната страна на листата. При силно нападение целите листа придобиват бронзов вид, след което пожълтяват и преждевременно окапват.

Високите температури и ниската атмосферна влажност през повечето дни от периода ще бъдат предпоставка за увеличение популацията на акарите. В ябълковите насаждения е необходимо да се следи за наличие на най-опасният - червения овощен акар и при численост над ПИВ (3-4 подвижни форми на лист) се препоръчва навременно третиране. При необходимост растителнозащитните пръскания трябва да се провеждат през похладните часове от деня, при температури под 25°C.

В източните и южните райони не се очакват валежи и условията ще бъдат подходящи за прибиране на зърнената реколта.

През повечето дни от второто и третото десетдневие агрометеорологочните условия ще се определят от относително сухо, топло, а на много места в полските райони и от горещо време, с екстремно високи максимални температури, достигащи до 38-43^{0}C. Тези стойности са предпоставка за топлинен стрес, нарушен воден баланс и стерилност при встъпилите във фаза цъфтеж пролетници.

През второто и третото десетдневие на юли валежи със стопанско значение не се очакват, което ще налага прилагане на повишени поливни норми при по-късните пролетни и зеленчукови култури.

Прогнозираните наднормени топлинни условия ще скъсяват междуфазните периоди в развитието на царевицата и слънчогледа. В края на второто и началото на третото десетдневие част от ранните хибриди царевица ще встъпят във фаза млечна зрелост. При слънчогледа ще протича формиране и наливане на семената. В края на месеца на места в крайните южни райони при засетите в агротехнически срок посеви ще се наблюдава и начало на фаза узряване.



Брашнестата мана е често срещано заболяване по много зеленчукови видове. Различни са патогените, които го причиняват - Erysiphe spp., Sphaerotheca spp.; Leveillula spp. и Oidium spp. Всеки патоген атакува само определени видове растения. От зеленчуковите култури, засегнати от брашнеста мана, са домати, краставици, пипер, патладжан, моркови, дини, пъпеши, други тиквови, грах, градински фасул, марули, салати, както и картофите. За развитието си брашнестата мана обикновено не изисква капка вода за покълване на конидиите, но се нуждае от висока въздушна влажност и температура.

През юли метеорологичните условия ще ограничават развитието на редица гъбни болести, с изключение на брашнестите мани по овошките, зеленчуковите култури и лозата.

Не подценявайте второто поколение на плодовите червеи

През месеца сериозна опасност за овощните култури е второто поколение плодови червеи. При лозата, особено при десертните сортове, повреди

ISSN 2815-522X

причиняват гъсениците от второто поколение на шарения гроздов молец. През месеца при необходимост растителнозащитните пръскания трябва да се провеждат през по-хладните часове на деня.

Съществува висок риск за градушки.



През юли прибирането на зърнената реколта ще се осъществява в условия на повишена пожароопасност.