Растителна защита
електронно списание за растителна защита
семена, торове и земеделие
ISSN 2815-522X

Август – високи температури и валежи около нормите за месеца

Растителна Защита

Дата 03.08.2026 | **Брой** 8/2026 | **ISSN** 2815-522X | **Език** BG
www.plant-protection.com/article/2446?lang=bg



През август агрометеорологичните условия ще се определят от температури над климатичните норми и валежи около нормите за месеца.

В началото на август развитието на земеделските култури ще протича при горещо време, а на места в Дунавската равнина и в част от южните райони – и при дефицит на почвена влага. Юлските валежи бяха неравномерно разпределени. В края на юли наднормени валежи и добри почвени влагозапаси в 50 и 100cm слой са регистрирани в Североизточна България и в част от Горнотракийската низина (Шумен- 123 l /m², Силистра - 89 l /m², Добрич - 69 l /m², Варна - 90 l /m², Пловдив - 73 l /m²).

През първите дни от месеца прогнозираните екстремно високи максимални температури, до и над 38-39°C, ще нарушават нормалния ход на физиологичните процеси при земеделските култури, ще влияе негативно на цъфтежа и оплождането при късните зеленчуковите култури и късните хибриди царевица.

В зависимост от сроковете на сеитба и ранозрелостта, при царевицата ще се наблюдават и фази на преход от млечна към восъчна зрелост при ранните хибриди, както и наливане на зърното при среднокъсните. Слънчогледът, засят в агротехнически срок, ще е във фаза – наливане на семената.

Високите температури и прогнозираната липса на валежи ще ограничат появата на гъбни болести по полските култури с изключение на тези, отглеждани при поливни условия.

В овощните градини и лозята, е препоръчително да се следи за наличие на акари, плодови червеи и молци.

Краткотрайно понижение на температурите, превалявания и подобрение на условията за вегетацията на вторите култури и късните хибриди царевица се очаква в края на първото десетдневие. През десетдневието при по-ранните хибриди царевица ще протича фаза млечна зрелост и преход към восъчна зрелост, а при средноранните – нали-

ване на зърното. При слънчогледа на места в Дунавската равнина и в южните райони на страната ще се наблюдава начало на фаза узряване.



Беритбата на ранния български десертен сорт грозде Супер ран Болгар започна в началото на август 2026 г. Първите масови гроздоберни кампании стартираха в село Татарево, Пловдивски регион. Сортът е създаден през 1961 г. чрез кръстоска на сортовете Италия и Янтър в Института по лозарство и винарство в Плевен. Гроздето от този сорт зрее рано (в първите дни на август) и дружно, което позволява беритбата да се извършва наведнъж. При пълна зрялост Супер ран Болгар натрупва между 15% и 20% захари, съчетани с умерен баланс на киселини (5-6 г/л).

През този период ранните десертни сортове грозде (Амира, Супер ран Болгар, Плевен, Мечта, Мискет ран, Черна перла и др.) ще встъпят в консумативна зрялост.

През второто и третото десетдневие прогнозираните температури, около и над климатичните норми, ще ускорят последните фази от развитието на късните земеделски култури. В края на второто десетдневие при слънчогледа в равнинните райони ще се наблюдава масово техническа зрелост, а в края на третото - средно късните хибриди царевица ще приключат развитието си.

През третото десетдневие на август се прогнозира се повишена вероятност за валежи, подобрение съдържанието на влага горните почвени слоевеве и на условията за провеждане на дълбока оран и предсеитбени обработки на площите предвидени за засяване със зимна рапица. През десетдневието започва агротехническият срок за сеитбата на рапица.

Метеорологичните условия през август ще ограничават развитието на гъбни болести, с изключение на брашнестите мани по зеленчуковите култури, овошките и лозите. През месеца продължава вредната дейност на второто поколение плодови червеи. Очаква се увеличение популацията на акарите.



В лозовите масиви е необходимо да се следи за появата и плътността на гъсениците от третото поколение на шарения гроздов молец

При необходимост растителнозащитните пръскания трябва да се провеждат през по-хладните часове на деня, при температура под 25 ºС, с препарати с подходящ карантинен срок съобразен с периода на зреене на културите.

Още по темата:

Растителнозащитни грижи при лозя през август