Растителна защита
електронно списание за растителна защита
семена, торове и земеделие
ISSN 2815-522X

Боксер Ево: чист старт за житните култури

syngenta, България

Дата 21.09.2026 | **Брой** 9/2026 | **ISSN** 2815-522X | **Език** BG
www.plant-protection.com/article/2470?lang=bg



Боксер Ево е новият хербицид от Синджента, създаден в отговор на едно от основните предизвикателства при житните култури: заплевеляването. Продуктът съчетава две активни вещества, просулфокарб и дифлуфеникан, със силна синергия помежду си, което осигурява надежден и широкоспектърен контрол на плевелите.

Приложен почвено или ранно-вегетационно (есенно), Боксер Ево елиминира конкуренцията от плевелите още в началото и дава на пшеницата, ечемика, ръжта и тритикалето чист старт и добри условия за развитие.

Основни предимства:

Високо ефикасен ранен контрол на широк спектър житни и широколистни плевели

Отличен контрол на трудни житни плевели: райграс, овсига, власатка, лисича опашка, едногодишна метлица (преди и след поникване)

Надеждна ефикасност срещу широколистни плевели: великденче, теменужка, лепка, лайка, синя метличина и други

Два различни механизма на действие за по-висока ефикасност и устойчив контрол

Отличен партньор за управление на резистентност, включително при трудни за контрол популации

Боксер Ево е основата, върху която производителите могат да надграждат.

Механизъм на действие

Боксер Ево комбинира две активни вещества с два различни механизма на действие:

Просулфокарб потиска деленето на клетките и поникването и развитието на плевелите. Абсорбира се основно от кореновата част на растенията, като основният ефект е при поемане през хипокотила. Поема се от почвата чрез корените.

Дифлуфеникан нарушава синтеза на каротеноиди, при което хлорофилът се разгражда.

Комбинацията от два различни механизма осигурява по-висока ефикасност и е ключова за устойчивото управление на резистентност.

Интегрирана технология за справяне с резистентни форми райграс

Контрол в два ключови момента от развитието на житните култури:

Есен, Боксер Ево: 300 мл/дка, преди поникване или след поникване (1-2-ри лист)

Пролет, Авокса: 160-180 мл/дка

Предимства на есенното третиране: елиминиране на покълващите и поникващи плевели през есента, редуциране на плевелния запас в почвата, създаване на условия за чист старт и добро развитие на културните растения.

Предимства на пролетното третиране: елиминиране на конкуренцията от поникващите плевели, намаляване на негативния ефект от конкуренцията, запазване на потенциала от единица площ.

Два различни механизма на действие в два ключови момента означават по-висока ефикасност и намалена плътност на заплевеляване.

Регистрирани при: Пшеница, Ечемик, Ръж, Тритикале

Момент на приложение по BBCH

Почвено или ранно вегетационно приложение във фаза BBCH 00-09 (преди поникване) или BBCH 10-13 (1-2-ри лист), доза 300 мл/дка.

Доказана ефикасност в опитни полета Синджента България

Резултати от почвено и ранно вегетационно приложение при сезон 2024-2025 в Южна централна България (с. Отец Кирилово) и Североизточна България (гр. Попово), с ясно изразена ефикасност спрямо необработената контрола.

Съвети за приложение

Почвено или ранно вегетационно (1-ви-2-ри лист)

Доза на приложение: **300 мл/дка**

Количество вода: **16-30 л/дка**

Вижте още за **Боксер Ево** от Синджента!