Во второй половине ноября будут условия для проведения сезонных агротехнических мероприятий и посадки плодовых деревьев

Растителна Защита

Дата 09.11.2025 | **Выпуск** 11/2025 | **ISSN** 2815-522X | **Язык** RU
www.plant-protection.com/article/2315?lang=ru



Агрометеорологические условия в ноябре будут определяться температурами, близкими к климатическим нормам и выше их, а также осадками в пределах и ниже нормы для месяца.

К концу первой и началу второй декады ноября агрометеорологические условия будут определяться неустойчивой погодой. Осадки в конце прошедшего семидневного периода и ожидаемые в течение следующего еще больше задержат, сверх агротехнических сроков, посев пшеницы. К настоящему времени посеяно около половины запланированных площадей.

Осадки в октябре, которые превысили климатические нормы в два-три раза (София, Плевен, Ловеч, В. Тырново, Разград, Русе, Пазарджик, Стара Загора, Бургас), поддерживали высокое содержание влаги в верхних слоях почвы, что задержало предпосевную обработку и посев озимых зерновых. По этой объективной причине в большинстве районов страны, за исключением некоторых районов Дунайской равнины и восточных регионов, были пропущены агротехнические сроки посева пшеницы в октябре. Значительная часть площадей, запланированных под озимые зерновые, будет посеяна в ноябре. Велика вероятность того, что ноябрьские посевы не успеют войти в фазу кущения, подходящую для перезимовки, к концу их осенней вегетации.

ISSN 2815-522X

В большинство дней ноября прогнозируются среднесуточные температуры выше нормы, что будет поддерживать активные вегетационные процессы у осенних культур. В конце месяца у пшеницы и ячменя будут наблюдаться различные фазы, в зависимости от сроков посева. Для культур, посеянных в ноябре, произойдет прорастание и формирование листьев (1-2-3 листа). В небольшой части посевов пшеницы в некоторых районах Дунайской равнины и в восточных регионах (Добрич, Генерал Тошево, Тервел, Провадия, Карнобат), которые были посеяны ранней осенью, будет наблюдаться начало фазы кущения.



Самым опасным вредителем зерновых культур является обыкновенная хлебная жужелица (Zabrus tenebrioides), которая поражает пшеницу, ячмень, кукурузу, овес и ряд злаковых трав.

В начальных фазах вегетации пшеницы и ячменя следует проводить обследование посевов на наличие вредителей. Повреждения наносятся обыкновенной полевкой, личинками хлебной жужелицы и злаковыми мухами, и если плотность превышает ЭПВ (экономический порог вредоносности), необходима своевременная защита растений.

ISSN 2815-522X



В ноябре более благоприятные условия для посадки плодовых деревьев и проведения фитосанитарных мероприятий на плодовых культурах сложатся во второй декаде. Для семечковых культур (яблоня, груша), пораженных паршой, рекомендуется обработка 5%-ным раствором мочевины. Для косточковых культур целесообразно опрыскивание 2%-ной бордоской смесью против возбудителей дырчатой пятнистости, монилиоза и курчавости листьев персика.