Растителна защита
електронно списание за растителна защита
семена, торове и земеделие
ISSN 2815-522X

"Ново бедствие: БАБХ обявява бедствено положение поради марокански скакалци, земеделските земи в Югоизточна България вече са засегнати"

Растителна Защита

Дата 31.05.2026 | **Выпуск** 5/2026 | **ISSN** 2815-522X | **Язык** RU
www.plant-protection.com/article/2423?lang=ru



Болгарское агентство по безопасности пищевых продуктов (БАБПП) принимает срочные меры по борьбе с марокканской саранчой (Dociostaurus maroccanus) в Благоевградской области. По предложению исполнительного директора БАБПП министр сельского хозяйства и продовольствия 22.05.2026 года издал приказ об объявлении стихийного бедствия. Хотя первоначальные данные указывали, что пострадали в основном луга, пастбища и залежные земли в общинах Петрич и Сандански, ситуация изменилась в конце месяца, и теперь саранча также поразила сельскохозяйственные угодья.

Распоряжением мэра Димитра Бричкова в общине Петрич было объявлено частичное чрезвычайное положение. Причиной этой меры стало именно нашествие марокканской саранчи, которая серьезно затронула сельскохозяйственные районы.

Пострадавшие районы и предстоящие меры

В общей сложности 1500 декаров составляют пострадавшие территории, расположенные на землях двух сел. Заражение вредителем в основном сосредоточено на земле села Генерал Тодоров, где поражено 1200 декаров. На земле села Марикостиново площадь меньше – 300 декаров.

Региональная дирекция по безопасности пищевых продуктов (РДБПП) – Благоевград оказывает помощь муниципальным и региональным властям в реализации мер по защите растений. Период применения мер борьбы с марокканской саранчой продлится до 30 июня 2026 года.

Община Петрич уже организовала обработку территорий, ожидается доставка необходимого препарата для обработки. При благоприятных погодных условиях опрыскивание начнется в начале

ISSN 2815-522X

следующей недели. Будут применяться только разрешенные средства защиты растений. После обработки будет введен 7-дневный карантинный период. Дополнительная информация о точном начале процесса обработки будет опубликована немедленно после получения препарата.

Предупреждение фермерам

Обработка пораженных участков будет проводиться при строгом соблюдении всех необходимых мер для защиты здоровья людей, животных, пчел и водных организмов.

Власти уведомляют владельцев скота и лиц, содержащих пчелиные семьи, о необходимости принять необходимые меры предосторожности:

- В течение 7-дневного карантинного периода животные не должны выпускаться за пределы ферм во избежание риска для их здоровья.
- БАБПП призывает владельцев пчелиных семей поддерживать постоянный контакт с мэрами населенных пунктов для своевременного получения информации о предстоящих обработках и защиты своих пчел.

Почему марокканская саранча так опасна?

moroccan

Марокканская саранча (Dociostaurus maroccanus) — это вид из семейства Acrididae, который имеет космополитическое распространение и встречается повсеместно в нашей стране.

- **Внешний вид и происхождение:** Она значительно меньше пустынной саранчи. Ее характерной особенностью является темный X-образный рисунок на спине. Вид встречается в основном в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Средней Азии и Южной Европе, включая Балканы. Он не является инвазивным видом для Европы, но исторически присутствует, причем Болгария находится на периферии его ареала (с исторически зафиксированными вторжениями в Южной и Центральной Болгарии).
- **Развитие:** Насекомое находит благоприятные условия для откладки яиц и развития на целинных, залежных землях и пастбищах.
- **Роевое поведение:** При определенных условиях она может переходить из одиночной фазы в стадную, образуя рои. Они передвигаются стаями, которые могут достигать нескольких километров в длину и ширину.
- **Ущерб:** Она поражает почти все культурные растения, предпочитая травянистую растительность – зерновые, бобовые, овощи, плодовые культуры и виноградники. При высокой плотности она способна уничтожать растительность на больших площадях. Рои могут преодолевать сотни километров, уничтожая посевы на своем пути, иногда пролетая до 50 км в день.