"В июле агрометеорологические условия будут определяться относительно сухой и жаркой погодой, что является предпосылкой для теплового стресса у сельскохозяйственных культур."

Растителна Защита

Дата 02.07.2026 | **Выпуск** 7/2026 | **ISSN** 2815-522X | **Язык** RU
www.plant-protection.com/article/2437?lang=ru



В конце июня и начале июля развитие сельскохозяйственных культур будет проходить при температуре выше нормы, а во многих местах восточных и юго-восточных районов — при формирующемся дефиците влаги в 50-сантиметровом слое почвы. Низкие, ниже 65% от полевой влагоемкости (ПВ), запасы почвенной влаги для яровых культур в части северо-восточных районов (агростанции Разград, Силистра). В западных и центральных районах после осадков в третьей декаде июня произошло улучшение запасов почвенной влаги — важное для яровых культур, некоторые из которых находятся в репродуктивной стадии развития с повышенными требованиями к почвенной влаге.



В начале июля у подсолнечника на высоких полях будет наблюдаться образование соцветий, а в полевых районах — начало фазы цветения. У кукурузы, в зависимости от ее скороспелости, будут происходить различные фазы: образование листьев, выметывание метелки и цветение метелки,

ISSN 2815-522X

в основном у ранних гибридов. В течение периода прогнозируемые высокие максимальные температуры порядка 37-38°C окажут неблагоприятное влияние на цветение и оплодотворение яровых культур.



В сухую и теплую погоду увеличивается плотность популяции красного плодового клеща. В течение лета он развивает несколько поколений, что приводит к большому накоплению вредителя на растениях. При очень высокой плотности или конкуренции с другими видами паутинных клещей подвижные формы (личинки, нимфы и взрослые особи) красного плодового клеща могут переходить и высасывать сок также с верхней стороны листьев. В случаях сильного заражения целые листья приобретают бронзовый вид, после чего желтеют и преждевременно опадают.

Высокие температуры и низкая влажность воздуха в течение большинства дней периода будут предпосылкой для увеличения популяции клещей. В яблоневых садах необходимо следить за наличием самого опасного — красного плодового клеща — и при превышении численности экономического порога вредоносности (ЭПВ) (3-4 подвижные формы на лист) рекомендуется своевременная обработка. При необходимости опрыскивания средствами защиты растений следует проводить в более прохладные часы дня при температуре ниже 25°C.

В восточных и южных районах осадков не ожидается, и условия будут подходящими для уборки зерновых культур.

В течение большинства дней второй и третьей декад агрометеорологические условия будут определяться относительно сухой, теплой, а во многих местах полевых районов — жаркой погодой с экстремально высокими максимальными температурами, достигающими 38-43°C. Эти значения являются предпосылкой для теплового стресса, нарушения водного баланса и стерильности яровых культур, вступивших в фазу цветения. В течение второй и третьей декад июля осадков экономического значения не ожидается, что потребует применения повышенных оросительных норм для поздних яровых и овощных культур.

Прогнозируемые температурные условия выше нормы сократят межфазные периоды в развитии кукурузы и подсолнечника. В конце второй и начале третьей декады часть ранних гибридов кукурузы вступит в фазу молочной спелости. У подсолнечника будут происходить образование и налив семян. В конце месяца местами в крайних южных районах будет наблюдаться также начало фазы созревания у посевов, произведенных в агротехнические сроки.



Мучнистая роса — распространенное заболевание многих овощных культур. Возбудители, вызывающие его, различны — Erysiphe spp., Sphaerotheca spp.; Leveillula spp. и Oidium spp. Каждый патоген поражает только определенные виды растений. Среди овощных культур, поражаемых мучнистой росой, — томаты, огурцы, перцы, баклажаны, морковь, арбузы, дыни, другие тыквенные, горох, стручковая фасоль, салат, листовая зелень, а также картофель. Для своего развития мучнистой росе обычно не требуется капля воды для прорастания конидий, но ей необходимы высокая влажность воздуха и температура.

В июле метеорологические условия будут ограничивать развитие ряда грибных заболеваний, за исключением мучнистых рос на плодовых деревьях, овощных культурах и винограде.

Не стоит недооценивать второе поколение плодовых червей

ISSN 2815-522X

В течение месяца серьезную опасность для плодовых культур представляет второе поколение плодовых червей. На виноградниках, особенно у столовых сортов, ущерб наносят гусеницы второго поколения гроздевой листовертки. В течение месяца при необходимости опрыскивания средствами защиты растений следует проводить в более прохладные часы дня.

Существует высокий риск града.



В июле уборка зерновых культур будет проходить в условиях повышенной пожарной опасности.