Растителна защита

електронно списание за растителна защита
семена, торове и земеделие
ISSN 2815-522X

Агротехнические мероприятия на многолетних культурах в июле

ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата 05.07.2026 | **Выпуск** 7/2026 | **ISSN** 2815-522X | **Язык** RU
www.plant-protection.com/article/2439?lang=ru



В июле будет преобладать солнечная и жаркая погода, прерываемая короткими периодами неустойчивости с грозами. Осадки будут распределены неравномерно – во многих местах их будет недостаточно в течение длительных периодов, тогда как в других районах локальные штормы могут принести значительное количество дождя за короткое время. Текущие атмосферные сигналы указывают на то, что июль имеет потенциал для температур немного выше климатической нормы, особенно во второй половине месяца. В течение первой декады месяца в первые дни июля ожидается период неустойчивой и немного более прохладной погоды, вызванный прохождением холодного атмосферного фронта через страну. Над большей частью Болгарии разовьются грозы, осадки и град, а северо-западный ветер усилится. После 5-7 июля атмосфера стабилизируется, будет преобладать больше солнечных часов, и температуры постепенно повысятся. Минимальные температуры будут между 15 и 20 °C, а дневные температуры достигнут 30 °C – 35 °C, не исключены значения около 36 °C в самых теплых районах Дунайской равнины и Верхнефракийской низменности. В середине месяца увеличивается вероятность установления более длительного жаркого периода. Максимальные значения будут между 33 °C и 38 °C, а в некоторых районах Северной Болгарии и Фракийской низменности они могут временно достигать 39 °C. Несмотря на преобладающую солнечную погоду, к концу периода не исключено прохождение слабого атмосферного возмущения, которое может вызвать кратковременные грозы в западных регионах и горах. Они будут локальными, но в некоторых местах могут быть интенсивными и сопровождаться сильными порывами ветра и градом. Последняя декада месяца сохранит свой типичный летний характер. Ожидаются продолжительные солнечные периоды, с наименьшей вероятностью осадков в Восточной Болгарии и вдоль черноморского побережья. В западных и горных регионах будут условия для послеполуденных кучево-дождевых облаков, но осадки будут в основном локальными. Минимальные температуры будут между 17 °C и 22 °C, а максимальные температуры достигнут 32

°C – 37 °C, не исключени температури около 39 °C – 40 °C в некоторые дни в самых жарких районах страны. *В плодовых питомниках* Посевные гряды регулярно поливаются и обрабатываются, чтобы обеспечить максимально возможный процент стандартного подвойного материала. Маточные плантации орошаются и, при необходимости, окучиваются. Чтобы обеспечить условия для хорошего развития окулированных растений, во втором поле питомника при необходимости проводится удаление поросли. Груши, в частности, регулярно обрабатываются и орошаются. В первом поле питомника начинается окулировка подвоев. Подвои с почками, которые не прижились, переокулируются. Примерно через две недели после окулировки осматриваются обвязки. Те, которые врезались, ослабляются. *В плодовых насаждениях* Продолжается работа по наклону скелетных ветвей при формировании пальметты. С помощью орошения влажность почвы поддерживается выше 70% от полевой влагоемкости (ПВ). С помощью дисковой бороны, культиватора, роторного культиватора и роторного культиватора со смещенной секцией поверхность почвы в междурядьях и рядах поддерживается в обработанном состоянии и свободной от сорняков, если площадь между растениями не залужена. Продолжается работа по уборке черешни и вишни.



Начинается массовая уборка абрикосов и персиков. *В плантациях клубники* Продолжается уход за орошением вновь заложенных плантаций клубники, особенно тех, которые были посажены в июне. В более низких и теплых районах, где уборка урожая завершена, солома собирается, удаляется и сжигается.



Уборка урожая продолжается в более высоких и прохладных местах. После удаления соломы плантации орошаются и обрабатываются, предварительно удобренные 10-12 кг аммиачной селитры или другого азотного удобрения в той же концентрации на декар. Маточные плантации, из которых будет производиться посадочный материал, орошаются, удобряются 15-20 кг аммиачной селитры на декар и пропалываются. Усы в плантациях, из которых посадочный материал не берется, вырезаются. Определяются и подготавливаются новые участки для плантаций клубники для осенней посадки в открытом грунте. Перед глубокой обработкой участок удобряется 2-4 тоннами навоза, 60-80 кг суперфосфата и 20-30 кг сульфата калия на декар. *В плантациях малины* Продолжается уход за орошением и обработкой новых плантаций. Плодоносящие плантации орошаются и обрабатываются.

Оросительная норма составляет 50-60 $дм^3$ на декар.



Проводится массовая уборка урожая. Обеспечивается уход за маточными плантациями малины – орошение и обработка, для обеспечения максимального количества посадочного материала – корневых отпрысков. Плантации осматриваются, вычищаются примеси других сортов, вырезаются старые

отплодоносившие побеги, собираются и сжигаются. *В плантациях черной смородины* Продолжается уход за грядами укоренения. Почва орошается и обрабатывается. В молодых и плодоносящих плантациях не допускается засоренность. Плантации удобряются азотным удобрением (1/3 годовой нормы).



Проводится массовая уборка урожая. Во время уборки отмечаются примеси других сортов для последующего выкорчевывания, а также больные и слабые растения. После уборки удаляются сломанные, недоразвитые и лишние побеги. *В плантациях с другими культурами* Отмечаются желаемые сорта и формы инжира для получения черенков. Получаются черенки киви, лавра благородного, аронии, облепихи и граната для укоренения в теплице с искусственным туманом. Черенки формируются и обрабатываются раствором индолилмасляной кислоты в течение 5 секунд. В теплицах с искусственным туманом они обрабатываются в субстрате из двух частей перлита и одной части торфа. Начинается окулировка кавказских подвоев хурмы хурмой и саженцев киви культурными сортами. Продолжается подвязка лиан киви к проволочной шпалере. Проводится летняя обрезка киви. Окулируются зизифус и фисташка, собираются плоды инжира.



Ближе к концу месяца начинается уборка плодов облепихи и аронии. *На виноградниках* В июле температура значительно повышается, и потребность виноградной лозы в воде увеличивается из-за усиленной транспирации и интенсивного роста ягод. Это требует особого внимания к своевременному и качественному выполнению обработки почвы и орошения, где в этом есть необходимость. Сроки орошения определяются влажностью почвы в корневой зоне, которая не должна опускаться ниже 70–75% полевой влагоемкости (ПВ).



Сроки орошения также можно определять по некоторым внешним признакам на лозах, таким как прекращение роста и выпрямление кончиков побегов, преждевременное пожелтение самых нижних листьев и ожог их краев. Оросительная норма для виноградников составляет от 50 до 100 литров на квадратный метр. Наиболее важными зелеными операциями, которые необходимо провести в июле на плодоносящих виноградниках, являются удаление пасынков (пасынкование) и чеканка побегов (каршине). Удаление пасынков состоит в полном или частичном удалении боковых побегов, выросших из летних почек в узлах основного побега. Эта операция обязательна для столовых сортов винограда и сильнорослых виноградников, где создаются условия для сильного затенения и развития болезней и вредителей. Наиболее правильно проводить пасынкование, оставляя 4–5 листьев от основания пасынка. У сильнорослых сортов, особенно при формировках типа пергола, в некоторых случаях полезно удалять некоторые пасынки полностью, чтобы избежать затенения гроздей. Чеканка побегов включает удаление растущей верхушки побега вместе с 5–8 недоразвитыми листьями. Для винных и столовых сортов винограда она проводится после того, как рост побегов замедлился. Виноградники с

ISSN 2815-522X

высоким штамбом и слабо- и средне-рослые пергольные лозы не чеканятся. Эта практика необходима для сильнорослых виноградников, сформированных на средних штамбах или близко к земле. После чеканки обязательно, чтобы на побегах столовых сортов винограда осталось не менее 12–15 листьев выше грозди, а для винных сортов – 10–12. Также проводится следующее удаление пасынков и подвязка зеленых побегов на маточных плантациях лозы. На грядах укоренения обрабатывается почва и проводится борьба с сорняками. Применяются орошение и подкормка.