Растителна защита
електронно списание за растителна защита
семена, торове и земеделие
ISSN 2815-522X

В конце июля агрометеорологические условия будут определяться нестабильной погодой и риском града.

Растителна Защита

Дата 27.07.2026 | **Выпуск** 7/2026 | **ISSN** 2815-522X | **Язык** RU
www.plant-protection.com/article/2442?lang=ru



Грозы и град в конце второй и начале третьей декады июля нанесли серьезный, а местами в южных и восточных регионах — невосполнимый ущерб сельскохозяйственным культурам.

В первой половине недели агрометеорологические условия будут определяться неустойчивой погодой. В середине периода вновь прогнозируются град — очередное испытание для сельскохозяйственных культур.

Стабилизация погоды и улучшение условий для проведения сезонных агротехнических мероприятий, важнейшим из которых является завершение уборки пшеницы, ожидается в конце месяца.

Развитие сельскохозяйственных культур в последнюю неделю июля будет проходить при температурах около и выше климатических норм, а в части восточных регионов страны также при наличии хороших запасов почвенной влаги — благодаря значительным осадкам за прошедший семидневный период, которые местами превысили месячные нормы (Тутракан — 66 л/м², Нови Пазар — 74 л/м², Добрич — 67 л/м², Варна — 57 л/м²).

В течение периода у кукурузы, в зависимости от ее скороспелости, будут наблюдаться различные фазы: молочная спелость у ранних гибридов, формирование и налив зерна — у среднеранних, цветение метелки и появление нитей у поздних гибридов кукурузы. У подсолнечника будет происходить налив семян. В конце месяца местами в крайних южных регионах будет наблюдаться также начало фазы созревания у посевов подсолнечника, произведенных в агротехнические сроки.

Не стоит недооценивать второе поколение плодовых червей

Более подходящие условия для проведения защитных опрыскиваний растений будут созданы во второй половине периода. Овощные культуры, плодовые деревья и виноградники, пострадавшие

ISSN 2815-522X

от града, следует при первой возможности обработать медьсодержащими фунгицидами для снижения риска вторичного заражения патогенами.



В июне гусеницы первого поколения яблонной плодожорки (Laspeyresia pomonella=Cydia pomonella) наносят ущерб. Повреждения часто остаются незамеченными из-за июньского опадания молодых плодов. После питания гусеница покидает поврежденный плод. Она спускается на шелковистой нити или выползает по стволу и в трещинах коры делает кокон, в котором окукливается. Гусеницы второго поколения плодовых червей чрезвычайно опасны для плодовых деревьев в июле и августе. Они обычно вызывают массовую червивость плодов.

В плодовых культурах в конце июля не следует недооценивать борьбу со вторым поколением плодовых червей. Защитные опрыскивания следует проводить в более прохладные часы суток препаратами с соответствующим сроком ожидания до сбора урожая, согласованным с периодом созревания культур.

'