Растителна защита
електронно списание за растителна защита
семена, торове и земеделие
ISSN 2815-522X

Август – высокие температуры и осадки около нормы для этого месяца

Растителна Защита

Дата 03.08.2026 | **Выпуск** 8/2026 | **ISSN** 2815-522X | **Язык** RU
www.plant-protection.com/article/2446?lang=ru



```html
В августе агрометеорологические условия будут определяться температурами выше климатических норм и осадками около нормы для данного месяца.

В начале августа развитие сельскохозяйственных культур будет проходить в условиях жаркой погоды, а местами на Дунайской равнине и в части южных регионов – также при дефиците почвенной влаги. Осадки в июле распределялись неравномерно. В конце июля в Северо-Восточной Болгарии и в части Верхнефракийской низменности были зарегистрированы осадки выше нормы и хорошие запасы почвенной влаги в слое 50 и 100 см (Шумен - 123 л/м², Силистра - 89 л/м², Добрич - 69 л/м², Варна - 90 л/м², Пловдив - 73 л/м²).

В первые дни месяца прогнозируемые экстремально высокие максимальные температуры, вплоть до 38-39°C и выше, нарушат нормальное течение физиологических процессов у сельскохозяйственных культур и негативно скажутся на цветении и оплодотворении у поздних овощных культур и поздних гибридов кукурузы.

В зависимости от сроков сева и скороспелости, у кукурузы также будут наблюдаться фазы перехода от молочной к восковой спелости у ранних гибридов, а также налив зерна у среднепоздних. Подсолнечник, посеянный в агротехнические сроки, будет находиться в фазе налива семян.

Высокие температуры и прогнозируемое отсутствие осадков ограничат распространение грибных заболеваний у полевых культур, за исключением выращиваемых в условиях орошения.

В садах и виноградниках целесообразно проводить мониторинг на наличие клещей, плодовых червей и мотыльков.

Кратковременное понижение температур, ливни и улучшение условий для вегетации вторых культур и поздних гибридов кукурузы ожидается в конце первой декады. В течение декады у более ранних гибридов кукурузы наступит фаза молочной спелости и переход к восковой, а у среднеранних – налив зерна. У подсолнечника местами на Дунайской равнине и в южных районах страны будет наблюдаться начало фазы созревания.
```

ISSN 2815-522X



Уборка раннего болгарского столового сорта винограда Супер Ран Болгар началась в начале августа 2026 года. Первые массовые кампании по сбору винограда стартовали в селе Татарево, Пловдивской области. Сорт был создан в 1961 году путем скрещивания сортов Италия и Янтар в Институте виноградарства и виноделия в Плевене. Виноград этого сорта созревает рано (в первые дни августа) и равномерно, что позволяет проводить уборку за один раз. При полной зрелости Супер Ран Болгар накапливает от 15% до 20% сахаров в сочетании с умеренным балансом кислот (5-6 г/л).

В этот период ранние столовые сорта винограда (Амира, Супер Ран Болгар, Плевен, Мечта, Мискет Ран, Черна Перла и др.) вступят в фазу потребительской зрелости.

В течение второй и третьей декад прогнозируемые температуры, около и выше климатических норм, ускорят завершающие фазы развития поздних сельскохозяйственных культур. В конце второй декады у подсолнечника на равнинах будет наблюдаться массовая техническая спелость, а в конце третьей – среднепоздние гибриды кукурузы завершат свое развитие.

В течение третьей декады августа прогнозируется повышенная вероятность осадков, что улучшит влагообеспеченность верхних слоев почвы и условия для проведения глубокой вспашки и предпосевной обработки участков, предназначенных для сева озимого рапса. В течение декады начинается агротехнический срок сева озимого рапса.

Метеорологические условия в августе ограничат развитие грибных заболеваний, за исключением мучнистой росы на овощных культурах, плодовых деревьях и виноградной лозе. В течение месяца продолжается вредоносная деятельность второго поколения плодовых червей. Ожидается увеличение популяции клещей.



В виноградниках необходимо следить за появлением и плотностью гусениц третьего поколения гроздевой листовертки

При необходимости опрыскивания средствами защиты растений следует проводить в более прохладное время суток, при температуре ниже 25 °C, препаратами с соответствующим сроком ожидания, согласованным с периодом созревания культур.

Подробнее по теме:

Защита виноградников в августе

```
```