Растителна защита
електронно списание за растителна защита
семена, торове и земеделие
ISSN 2815-522X

# Kasım ayının ikinci yarısında, mevsimlik agroteknik faaliyetlerin yürütülmesi ve meyve ağaçlarının dikimi için koşullar oluşacak.

**Растителна Защита**

**Tarih** 09.11.2025 | **Sayı** 11/2025 | **ISSN** 2815-522X | **Dil** TR
www.plant-protection.com/article/2315?lang=tr



Kasım ayındaki agrometeorolojik koşullar, iklim normlarına yakın ve üzerinde seyreden sıcaklıklar ile ay normu civarında ve altında seyreden yağışlarla belirlenecektir.

Kasım ayının ilk on günlük döneminin sonu ve ikinci on günlük döneminin başında agrometeorolojik koşullar değişken hava durumu ile belirlenecektir. Geçtiğimiz yedi günlük dönemin sonundaki yağışlar ve bir sonraki dönemde beklenen yağışlar, buğday ekimini agroteknik son tarihlerinin ötesine taşıyarak daha da geciktirecektir. Şu ana kadar planlanan alanların yaklaşık yarısı ekilmiştir.

Ekim ayında iklim normlarının iki ila üç katını aşan (Sofya, Plevne, Lofça, V. Tırnovo, Razgrad, Rusçuk, Pazarcık, Eski Zağra, Burgaz) yağışlar, üst toprak katmanlarında yüksek nem içeriğini koruyarak ekim öncesi hazırlığı ve kışlık tahılların ekimini geciktirmiştir. Bu objektif nedenden dolayı, ülkenin büyük bir kısmında, Tuna Ovası'ndaki bazı alanlar ve doğu bölgeleri hariç, Ekim ayındaki buğday ekimi için agroteknik son tarihler kaçırılmıştır. Kışlık tahıllar için planlanan alanların önemli bir kısmı Kasım ayında ekilecektir. Kasım ayında ekilen mahsullerin, sonbahar vejetasyonları sona ermeden kışlamaya uygun bir evre olan kardeşlenme evresine girememe olasılığı yüksektir.

Kasım ayının çoğu gününde, normalin üzerinde ortalama günlük sıcaklıklar tahmin edilmekte olup, bu durum sonbahar mahsullerinde aktif vejetasyon süreçlerini sürdürecektir. Ay sonunda, ekim tarihlerine bağlı olarak buğday ve arpada farklı evreler gözlemlenecektir. Kasım ayında ekilen mahsuller için çimlenme ve yaprak oluşumu (1-2-3 yaprak) meydana gelecektir. Tuna Ovası'nın bazı bölgelerinde ve doğu bölgelerinde (Dobriç, General Toşevo, Tervel, Provadya, Karnobat) erken sonbaharda ekilen buğday mahsullerinin küçük bir kısmında kardeşlenme evresinin başlangıcı gözlemlenecektir.



*Tahıl mahsullerinin en tehlikeli zararlısı, buğday, arpa, mısır, yulaf ve bir dizi tahıl otuna saldıran yaygın tahıl koşucu böceğidir (Zabrus tenebrioides).*

Buğday ve arpa vejetasyonunun başlangıç evrelerinde, mahsuller zararlılar açısından incelenmelidir. Ortak tarla faresi, tahıl koşucu böceğinin larvaları ve tahıl sinekleri hasara neden olur ve yoğunluk Eşik Ekonomik Zarar Seviyesi'nin (EIL) üzerindeyse zamanında bitki koruma gereklidir.

ISSN 2815-522X



Kasım ayında, meyve ağaçlarının dikimi ve meyve mahsullerinde fitosaniter faaliyetlerin yürütülmesi için daha uygun koşullar ikinci on günlük dönemde oluşacaktır. Kara leke hastalığından etkilenen yumuşak çekirdekli meyve türleri (elma, armut) için %5 üre çözeltisi ile uygulama önerilir. Sert çekirdekli meyve türleri için delik açan hastalık, erken kahverengi çürüklük ve şeftali yaprak kıvırcıklığına neden olan etkenlere karşı %2'lik Bordo bulamacı ile ilaçlama yapılması tavsiye edilir.