Растителна защита
електронно списание за растителна защита
семена, торове и земеделие
ISSN 2815-522X

Mart ayının başlarında, üst toprak katmanlarındaki yüksek nem içeriği, erken ilkbahar ürünlerinin ekimini güçleştirecektir.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 02.03.2026 *Брой:* 3/2026



Mart ayının ilk on günlük döneminde, tarımsal meteorolojik koşullar ortalamanın üzerindeki sıcaklıklarla belirlenecek. Ay başında tahmin edilen ılık hava, maksimum değerlerin 15-16°C'nin üzerinde olmasıyla, ülkenin tarla bölgelerindeki sonbaharda ekilen ürünlerde ve meyve bahçelerinde vejetatif süreçleri harekete geçirecek. Bu dönemde, kuzeybatı bölgelerdeki buğday ekimlerinde üçüncü yaprak evresi hakim olurken, doğu ve güney bölgelerde kardeşlenme evresi baskın olacak.

ISSN 2815-522X

Meyve bahçelerinde, kritik minimum sıcaklık tehlikesi olmadan, güney bölgelerde erken çiçek açan sert çekirdekli meyve türlerinde tomurcuk şişmesi ve tomurcuk patlaması evreleri görülecek.

Dönem boyunca önemli yağış beklenmemektedir. Şubat ayındaki ortalamanın üzerindeki yağışlar nedeniyle, çoğu tarla bölgesinde 100 cm'lik toprak katmanındaki nem rezervleri Tarla Kapasitesi seviyelerine ulaşmıştır. Aylık normları iki ila üç kat aşan yağış alan güney bölgelerin bazı kısımlarında (Sliven -111 l/m², St. Zagora - 130 l/m², Haskovo - 155 l/m², Kırcaali - 150 l/m², Elhovo - 121 l/m², Çırpan - 118 l/m²), kışlık tahıl ürünleri aşırı nemlenmiştir.



Önümüzdeki dönemde de, Güney Bulgaristan'ın birçok yerinde üst toprak katmanlarındaki yüksek nem içeriği, sonbaharda ekilen ürünlerin azotlu mineral gübrelerle üstten gübrelenmesini ve erken ilkbahar ürünleri (fiğ, bezelye, arpa) ekimi için ayrılan alanlarda ekim öncesi toprak işleme çalışmalarının yapılmasını zorlaştıracaktır.

İlk on günlük dönemin sonunda beklenen kısa süreli soğumanın ardından, ikinci on günlük dönemin çoğu günü için, kışlık tahıl ürünlerinin vejetasyonu için gerekli olan biyolojik minimumun üzerinde ortalama günlük sıcaklıklar tahmin edilmektedir.

Растителна защита
електронно списание за растителна защита
семена, торове и земеделие
ISSN 2815-522X



Mart ayının üçüncü on günlük döneminde, tarımsal ürünlerin gelişimi iklim normlarına yakın sıcaklıklarda ilerleyecek. Ay sonuna kadar buğdayda kardeşlenme evresi hakim olacak. Tarımsal teknik süresi içinde ekilen kışlık tahıl ürünlerinde, kardeşlenme katsayısında bir artış gözlemlenecektir.

Mart ayı boyunca meyve bahçelerinde şu evreler görülecek: meyve tomurcuklarında şişme, tomurcuk patlaması, tomurcuk oluşumu ve erken çiçek açan sert çekirdekli meyve türlerinde (badem, kayısı, şeftali, kiraz) çiçeklenme. Ay boyunca tahmin edilen eksi 7°C'ye kadar olan minimum sıcaklıklar, tomurcuk oluşumu ve çiçeklenme evrelerine girmiş meyve ağaçları için kritik olacaktır.

Mart ayında beklenen ve aylık normlara yakın olan yağışlar, kışlık tahıl ürünleri için iyi toprak nem rezervlerini koruyacaktır. Şubat ayındaki ortalamanın üzerindeki yağışlar nedeniyle (Şumen -103 l/m², Razgrad -104 l/m², Rusçuk - 103 l/m², Silistre - 100 l/m², Dobriç - 98 l/m², Hasköy - 155 l/m², Kırcaali - 151 l/m², Sliven -111 l/m², St. Zagora - 130 l/m², Elhovo - 123 l/m², Çırpan - 119 l/m²), sonbaharda ekilen ürünler için 100 cm'lik toprak katmanındaki nem rezervleri Tarla Kapasitesi'ne yakın seviyelere ulaşmıştır.

Mart ortasında, Güney Bulgaristan'da ayçiçeği ekimi için tarımsal teknik dönem (15-20.03) başlar ve üçüncü on günlük dönemin ortasında (25.03–5.04) – Tuna Ovası'nda başlar.