"Temmuz ayında, tarımsal meteorolojik koşullar, tarım ürünlerinde ısı stresi için bir ön koşul olan nispeten kuru ve sıcak hava tarafından belirlenecektir."

Растителна Защита

Tarih 02.07.2026 | **Sayı** 7/2026 | **ISSN** 2815-522X | **Dil** TR
www.plant-protection.com/article/2437?lang=tr



Haziran sonu ve Temmuz başında, tarımsal ürünlerin gelişimi normalin üzerindeki sıcaklıklar altında ve doğu ile güneydoğu bölgelerinin birçok yerinde 50 cm'lik toprak katmanında oluşan nem açığı koşullarında ilerleyecektir. Kuzeydoğu bölgelerinin bir kısmında (Razgrad, Silistra tarım istasyonları) bahar ürünleri için toprak nem rezervleri tarla kapasitesinin (TK) %65'inin altında, düşük seviyededir. Batı ve orta bölgelerde, Haziran ayının üçüncü on günlük dönemindeki yağışların ardından, toprak nem rezervlerinde bir iyileşme gözlenmiştir - bu durum, bazıları üreme gelişme aşamasında olan ve toprak nemine yönelik artan ihtiyaçları bulunan bahar ürünleri için önem taşımaktadır.



Temmuz başında, yüksek alanlardaki ayçiçeğinde çiçek tablası oluşumu, tarla alanlarında ise çiçeklenme döneminin başlangıcı gözlemlenecektir. Mısırda, erkenciliğine bağlı olarak farklı dönemler görülecektir: yaprak oluşumu, tepe püskülü çıkarma ve özellikle erkenci melezlerde tepe püskülünün çiçeklenmesi. Bu dönemde, tahmin edilen 37-38°C

civarındaki yüksek maksimum sıcaklıklar, bahar ürünlerinde çiçeklenme ve döllenme üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olacaktır.



Kuru ve sıcak havalarda, kırmızı meyve akarı (Avrupa kırmızı örümceği) popülasyon yoğunluğu artar. Yaz boyunca birkaç nesil geliştirir ve bu da zararlının bitkiler üzerinde büyük miktarda birikmesine yol açar. Çok yüksek yoğunlukta veya diğer tetranychid akar türleriyle rekabet durumunda, kırmızı meyve akarının hareketli formları (larvalar, nimfler ve erginler) yaprakların üst yüzeyine de geçerek özsuyunu emebilir. Şiddetli enfestasyon durumlarında, yaprakların tamamı bronz bir görünüm alır, ardından sararır ve erken dökülür.

Dönemin çoğu gününde görülen yüksek sıcaklıklar ve düşük atmosferik nem, akar popülasyonunda artış için bir ön koşul olacaktır. Elma bahçelerinde, en tehlikeli tür olan kırmızı meyve akarının varlığının izlenmesi gerekir ve sayı ekonomik zarar eşiğini (EZE) (yaprak başına 3-4 hareketli form) aştığında zamanında ilaçlama önerilir. Gerekirse, bitki koruma ilaçlamaları günün serin saatlerinde, 25°C'nin altındaki sıcaklıklarda yapılmalıdır.

Doğu ve güney bölgelerde yağış beklenmemektedir ve bu durum tahıl hasadı için uygun koşullar sağlayacaktır.

İkinci ve üçüncü on günlük dönemlerin çoğu gününde, agrometeorolojik koşullar nispeten kurak, sıcak ve tarla alanlarının birçok yerinde 38-43^{0}C'ye ulaşan aşırı yüksek maksimum sıcaklıklarla birlikte sıcak hava tarafından belirlenecektir. Bu değerler, çiçeklenme dönemine girmiş bahar ürünlerinde sıcaklık stresi, bozulmuş su dengesi ve kısırlık için bir ön koşuldur. Temmuz ayının ikinci ve üçüncü on günlük dönemlerinde ekonomik öneme sahip yağış beklenmemektedir; bu durum, geç ekilen bahar ve sebze ürünleri için artırılmış sulama oranlarının uygulanmasını gerektirecektir.

Tahmin edilen normalin üzerindeki termal koşullar, mısır ve ayçiçeğinin gelişiminde dönemler arası süreleri kısaltacaktır. İkinci on günlük dönemin sonunda ve üçüncü on günlük dönemin başında, erkenci mısır melezlerinin bir kısmı süt olum dönemine girecektir. Ayçiçeğinde tohum oluşumu ve dolumu gerçekleşecektir. Ay sonunda, çok güney bölgelerdeki bazı yerlerde, agroteknik süre içinde ekilen ürünlerde olgunlaşma döneminin başlangıcı da gözlemlenecektir.



Külleme, birçok sebze türünde yaygın görülen bir hastalıktır. Buna neden olan patojenler farklıdır - Erysiphe spp., Sphaerotheca spp.; Leveillula spp. ve Oidium spp. Her patojen yalnızca belirli bitki türlerine saldırır. Küllemeden etkilenen sebze bitkileri arasında domates, salatalık, biber, patlıcan, havuç, karpuz, kavun, diğer kabakgiller, bezelye, taze fasulye, marul, yeşil salata ürünleri ve patates bulunur. Külleme gelişimi için genellikle konidilerin çimlenmesi için bir damla su gerektirmez, ancak yüksek hava nemi ve sıcaklığa ihtiyaç duyar.

Temmuz ayında, meteorolojik koşullar, meyve ağaçları, sebze bitkileri ve asmalardaki külleme hastalıkları hariç, bir dizi fungal hastalığın gelişimini sınırlayacaktır.

Meyve kurtlarının ikinci neslini hafife almayın

Ay boyunca, meyve bitkileri için ciddi bir tehlike, meyve kurtlarının ikinci neslidir. Asmalarda, özellikle sofralık çeşitlerde, salkım güvesinin ikinci nesil tırtılları zarara neden olur. Ay boyunca, gerekirse, bitki koruma ilaçlamaları günün serin saatlerinde yapılmalıdır.

Dolu riski yüksektir.

ISSN 2815-522X



Temmuz ayında, tahıl hasadı artan yangın tehlikesi koşullarında gerçekleştirilecektir.