Растителна защита
електронно списание за растителна защита
семена, торове и земеделие
ISSN 2815-522X

Temmuz sonunda, tarımsal meteorolojik koşullar dengesiz hava ve dolu riski tarafından belirlenecektir.

Растителна Защита

Tarih 27.07.2026 | **Sayı** 7/2026 | **ISSN** 2815-522X | **Dil** TR
www.plant-protection.com/article/2442?lang=tr



Temmuz ayının ikinci on günlük döneminin sonu ile üçüncü on günlük döneminin başında yaşanan fırtınalar ve dolu yağışları, tarım ürünlerinde ciddi, güney ve doğu bölgelerindeki bazı yerlerde ise onarılamaz hasarlara yol açtı.

Haftanın ilk yarısında tarımsal meteorolojik koşulların dengesiz hava koşulları tarafından belirleneceği öngörülüyor. Dönemin ortasında yine dolu yağışı bekleniyor – bu da tarım ürünleri için bir başka sınav anlamına geliyor.

Ay sonunda hava koşullarının istikrar kazanması ve en önemlisi buğday hasadının tamamlanması olan mevsimlik tarımsal teknik faaliyetlerin yürütülmesi için koşulların iyileşmesi bekleniyor.

Temmuz ayının son haftasında tarım ürünlerinin gelişimi, iklim normallerinin civarında ve üzerindeki sıcaklıklarla devam edecek; ülkenin doğu bölgelerinin bir kısmında ise geçtiğimiz yedi günlük dönemdeki önemli yağışlar sayesinde iyi toprak nemi rezervlerinin varlığıyla da sürecek – bazı yerlerde bu yağışlar aylık normalleri aştı (Tutrakan - 66 l/m², Novi Pazar - 74 l/m², Dobriç - 67 l/m², Varna - 57 l/m²).

Dönem boyunca mısırda, erken olgunluğuna bağlı olarak farklı evreler görülecek: erken hibritlerde süt olumu, orta erkenci olanlarda tane oluşumu ve dolumu, geç mısır hibritlerinde ise tepe püskülü çiçeklenmesi ve koçan püskülü (ipek) çıkışı. Ayçiçeğinde ise tohum dolumu gerçekleşecek. Ay sonunda, en güney bölgelerdeki bazı yerlerde, tarımsal teknik dönem içinde ekilen ayçiçeği ürünlerinde olgunlaşma evresinin başlangıcı da gözlemlenecek.

İkinci nesil meyve kurtlarını hafife almayın

Bitki koruma ilaçlamalarının yapılması için daha uygun koşullar, dönemin ikinci yarısında oluşacak. Doludan zarar gören sebze ürünleri, meyve ağaçları ve asmalar, patojen kaynaklı ikincil enfeksiyon riskini azaltmak için ilk fırsatta bakır içeren fungusitlerle işlenmelidir.

ISSN 2815-522X



Haziran ayında, elma iç kurdu (Laspeyresia pomonella=Cydia pomonella) adlı zararlının birinci nesil tırtılları zarara neden olur. Genç meyvelerin haziran dökümü nedeniyle bu zarar genellikle fark edilmez. Beslendikten sonra tırtıl, zarar görmüş meyveyi terk eder. Kendini ipek bir iplikle aşağı sarkıtır veya gövdeden aşağı sürünür ve kabuk çatlaklarında pupa olduğu bir koza örer. İkinci nesil meyve kurtlarının tırtılları, temmuz ve ağustos aylarında meyve ağaçları için son derece tehlikelidir. Genellikle meyvelerde yaygın kurtlanmaya neden olurlar.

Temmuz sonunda meyve ürünlerinde, ikinci nesil meyve kurtlarına karşı mücadele hafife alınmamalıdır. Bitki koruma ilaçlamaları, günün daha serin saatlerinde, ürünlerin olgunlaşma dönemine uygun hasat öncesi bekleme süresine sahip ürünlerle yapılmalıdır.

,