Растителна защита
електронно списание за растителна защита
семена, торове и земеделие
ISSN 2815-522X

Ağustos – yüksek sıcaklıklar ve yağışlar ayın normları civarında

Растителна Защита

Tarih 03.08.2026 | **Sayı** 8/2026 | **ISSN** 2815-522X | **Dil** TR
www.plant-protection.com/article/2446?lang=tr



Ağustos ayında, tarımsal meteorolojik koşullar, iklim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar ve ay için normaller civarında yağışlarla belirlenecektir.

Ağustos başında, tarım ürünlerinin gelişimi sıcak hava koşullarında devam edecek ve Tuna Ovası'nın bazı bölgelerinde ve güney bölgelerinin bir kısmında toprak nemi eksikliği de yaşanacaktır. Temmuz yağışları dengesiz dağılmıştır. Temmuz sonunda, Kuzeydoğu Bulgaristan'da ve Yukarı Trakya Ovası'nın bir kısmında (Şumnu - 123 l/m², Silistre - 89 l/m², Dobriç - 69 l/m², Varna - 90 l/m², Filibe - 73 l/m²) normal üzeri yağış ve 50 ile 100 cm katmanında iyi toprak nemi rezervleri kaydedilmiştir.

Ayın ilk günlerinde, tahmin edilen aşırı yüksek maksimum sıcaklıklar (38-39°C ve üzeri), tarım ürünlerinde fizyolojik süreçlerin normal seyrini bozacak ve geç sebze ürünleri ile geç mısır hibritlerinde çiçeklenme ve döllenmeyi olumsuz etkileyecektir.

Ekim tarihlerine ve erken olgunluğa bağlı olarak, mısırda erken hibritlerde süt olumundan mum olumuna geçiş evreleri ve orta geç hibritlerde tane dolumu evreleri de görülecektir. Agroteknik süre içinde ekilen ayçiçeği, tohum dolum evresinde olacaktır.

Yüksek sıcaklıklar ve tahmin edilen yağış eksikliği, tarla ürünlerinde fungal hastalıkların görülmesini sınırlayacaktır; sulama koşullarında yetiştirilenler hariç.

Meyve bahçelerinde ve bağlarda, akar, meyve kurdu ve güve varlığının izlenmesi tavsiye edilir.

İlk on günlük dönemin sonunda, sıcaklıklarda kısa süreli bir düşüş, sağanak yağışlar ve ikinci ürünler ile geç mısır hibritlerinin vejetasyonu için koşulların iyileşmesi beklenmektedir. On günlük dönemde, erken mısır hibritleri süt olum evresini geçirip mum olumuna geçecek, orta erkenci olanlar ise tane dolumu yapacaktır. Ayçiçeğinde, Tuna Ovası'nın bazı yerlerinde ve ülkenin güney bölgelerinde olum evresinin başlangıcı gözlenecektir.

ISSN 2815-522X



Erkenci Bulgar sofralık üzüm çeşidi Super Ran Bolgar'ın hasadı Ağustos 2026 başında başladı. İlk toplu üzüm hasadı kampanyaları Filibe bölgesindeki Tatarevo köyünde başladı. Bu çeşit, 1961 yılında Pleven'deki Bağcılık ve Şarapçılık Enstitüsü'nde Italia ve Yantar çeşitlerinin çaprazlanmasıyla oluşturuldu. Bu çeşidin üzümleri erken (Ağustos'un ilk günlerinde) ve düzenli olarak olgunlaşır, bu da hasadın tek seferde yapılmasına olanak tanır. Tam olgunlukta, Super Ran Bolgar %15 ile %20 arasında şeker biriktirir ve orta düzeyde asit dengesi (5-6 g/l) ile birleşir.

Bu dönemde, erkenci sofralık üzüm çeşitleri (Amira, Super Ran Bolgar, Pleven, Mechta, Misket Ran, Cherna Perla, vb.) tüketici olumuna girecektir.

İkinci ve üçüncü on günlük dönemlerde, iklim normallerinin civarında ve üzerinde tahmin edilen sıcaklıklar, geç tarım ürünlerinin gelişiminin son evrelerini hızlandıracaktır. İkinci on günlük dönemin sonunda, ovalarda ayçiçeğinde toplu teknik olum görülecek ve üçüncünün sonunda, orta geç mısır hibritleri gelişimlerini tamamlayacaktır.

Ağustos'un üçüncü on günlük döneminde, yağış olasılığının arttığı tahmin edilmekte olup, üst toprak katmanlarının nem içeriğini iyileştirecek ve kışlık kolza tohumu ekimi için ayrılan alanlarda derin sürüm ve ekim öncesi işlemlerin yapılması için koşulları iyileştirecektir. On günlük dönemde, kolza tohumu ekimi için agroteknik dönem başlar.

Ağustos ayındaki meteorolojik koşullar, sebze ürünleri, meyve ağaçları ve asmalardaki külleme hastalıkları hariç, fungal hastalıkların gelişimini sınırlayacaktır. Ay boyunca, ikinci nesil meyve kurtlarının zararlı faaliyeti devam etmektedir. Akar popülasyonunda bir artış beklenmektedir.



Bağlarda, Avrupa salkım güvesinin üçüncü neslindeki tırtılların görünümünü ve yoğunluğunu izlemek gereklidir

Gerekirse, bitki koruma ilaçlamaları, günün daha serin saatlerinde, 25 °C'nin altındaki sıcaklıklarda, ürünlerin olum dönemine uygun hasat öncesi bekleme süresine sahip ürünlerle yapılmalıdır.

Konuyla ilgili daha fazlası:

Ağustos ayında bağlar için bitki koruma bakımı

'