Растителна защита
електронно списание за растителна защита
семена, торове и земеделие
ISSN 2815-522X

Eylül ayında, agrometeorolojik koşullar, iklim normlarının üzerindeki sıcaklıklar ve aylık normun civarında ve altındaki yağışlarla belirlenecektir.

Растителна Защита

Tarih 08.09.2026 | **Sayı** 9/2026 | **ISSN** 2815-522X | **Dil** TR
www.plant-protection.com/article/2462?lang=tr



Ağustos ayında düşen yağışlar yerel olup ülkenin büyük bir bölümünde, kuzeydoğu ve güneybatı bölgelerindeki yerler hariç, aylık normun %30'unun altında kalmıştır.

Eylül ayının ilk ve ikinci on günlük döneminin başlangıcında kısa süreli yağışlar öngörülmektedir, ancak derinleşen yaz kuraklığından sonra bu yağışlar üst toprak katmanlarının durumunda önemli bir değişikliğe yol açmayacaktır. Tarla bölgelerinin birçok yerinde kuru ve sıkışmış toprak, Eylül ayının ikinci yarısında da kışlık ürün ekimi için ayrılan alanlarda derin sürüm ve ekim öncesi toprak işlemesinin yapılmasını engelleyecektir. Kışlık kanola ekiminde - hassas agroteknik gerektiren bir ürün - gecikmeler beklenmektedir. Kanola ekimi için optimal agroteknik dönem Eylül ayının ikinci on günlük döneminin sonuna kadardır.

Eylül ayının ilk on günlük döneminde agrometeorolojik koşullar, iklim normlarının üzerindeki sıcaklıklarla belirlenecek ve bu durum geç çeşit ve hibrit tarım ürünlerinin gelişiminin son evrelerinin seyrini hızlandıracaktır. Eylül ayının ilk on günlük döneminde orta-geç mısır hibritlerinde tam olgunluk, geç hibritlerin bir kısmında ise mum olgunluğu gözlemlenecektir.



Normallerin üzerindeki yaz sıcaklıklarının bir sonucu olarak, beyaz şaraplık üzüm çeşitleri olağan dönemlerden daha erken teknolojik olgunluğa ulaşacak ve erken sonbahar elma çeşitlerinin bir

kısmı: Golden Parmen, Jonathan, Red Delicious, Golden Delicious, Canadian Renet ve diğer meyve ağaçları hasat olgunluğuna erişecektir. Ayın günlerinin çoğunda öngörülen güneşli ve sıcak hava, üzümlerde ve meyve ağaçlarının meyvelerinde daha fazla şeker sentezlenmesi ve depolanması için bir ön koşul olacaktır.



Tarla bölgelerinde koşullar, geç sıra ürünlerinin alanlarının temizlenmesi, üzüm hasadının toplanması ve ayçiçeği hasadının gerçekleştirilmesi için uygun olacaktır. Halihazırda Doğu Bulgaristan'da ayçiçeğinden elde edilen verimler geniş bir aralıkta değişmektedir. Kuzeydoğu bölgelerindeki yerlerde, Silistra tarım istasyonunda 370 kg/dka'nın üzerinde verim elde edilirken, güneydoğu bölgelerinin bir kısmında, Karnobat tarım istasyonunda 220 kg/dka'nın altında verim elde edilmiştir.

Eylül ayı boyunca meteorolojik koşullar, külleme hariç, fungal hastalıkların gelişimini sınırlayacaktır. Geç tarla üretiminden elde edilen sebze ürünlerinde, hasara neden olan ve sebze hasadının kalitesini bozan akarlar, lahana güvesi ve pamuk kurduna karşı bitki koruma ilaçlamaları hafife alınmamalıdır.



Armut tomurcuk hortumlu böceği (Anthonomus pyri)

Ay boyunca meyve ürünlerindeki zararlıların büyük bir kısmının zararlı faaliyeti sona ermektedir. Eylül ayının sonunda armut plantasyonlarının tehlikeli bir zararlı olan armut tomurcuk hortumlu böceğinin varlığı açısından incelenmesi arzu edilmektedir. Bu zararlıya karşı mücadele yalnızca erken sonbaharda ergin bireylere karşı etkilidir. Zararlının ekonomik zarar eşiğinin üzerinde bir yoğunluğunda (ağaç başına 3 böcek), ilaçlama yapılması gerekmektedir.

Eylül ayı boyunca kritik minimum sıcaklıklar öngörülmemektedir ve koşullar, beyazlatmaya tabi tutulan geç sebze ürünlerinden ek üretim oluşumuna izin verecektir.

Konuyla ilgili daha fazlası:

Sonbaharda armuttaki zararlıları hafife almayın