Растителна защита
електронно списание за растителна защита
семена, торове и земеделие
ISSN 2815-522X

三月初，表层土壤的高含水量将妨碍早春作物的播种。

Автор(и): Растителна защита
Дата: 02.03.2026 *Брой:* 3/2026

三月上旬，农业气象条件将由高于平均的气温所决定。月初预报的温暖天气，最高气温超过15-16°C，将激活全国大田区域秋播作物和果树的生长过程。在此期间，西北部地区的小麦作物将普遍处于三叶期，而东部和南部地区将以分蘖期为主。

对于果树而言，在没有临界最低温度威胁的情况下，南部地区早花的核果类树种将进入芽膨大和芽开放阶段。

该期间预计不会有显著降水。由于二月份降水高于平均水平，大部分大田区域100厘米土层的土壤水分储量已达到田间持水量水平。在部分南部地区，降水量超过月均值的两到三倍（斯利文 -111升/平方米，旧扎戈拉 - 130升/平方米，哈斯科沃 - 155升/平方米，克尔贾利 - 150升/平方米，埃尔霍沃 - 121升/平方米，奇尔潘 - 118升/平方米），导致冬季谷类作物水分过多。

ISSN 2815-522X

在接下来的时期，保加利亚南部许多地方上层土壤的高含水量也将阻碍对秋播作物进行氮素矿物肥料的追肥，以及计划用于早春作物（野豌豆、豌豆、春大麦）播种区域的播前整地作业。

在预计的上旬末短暂降温之后，中旬的大部分日子里，预报日平均气温将高于冬季谷类作物生长所需的生物学最低温度。

三月下旬，农作物的生长将在接近气候常态的温度下进行。到月底，小麦将普遍进入分蘖期。在农艺期限内播种的冬季谷类作物中，将观察到分蘖系数的增加。

ISSN 2815-522X

三月期间，果树将经历以下阶段：花芽膨大、花芽开放、花蕾形成，以及早花核果类树种（扁桃、杏、桃、樱桃）的开花。本月预报的最低温度，低至零下7°C，对于已进入花蕾形成和开花阶段的果树将是临界性的。

三月预计接近月均值的降水量，将为冬季谷类作物维持良好的土壤水分储量。由于二月份高于平均的降水量（舒门 -103 升/平方米，拉兹格勒 -104 升/平方米，鲁塞 - 103 升/平方米，锡利斯特拉 - 100 升/平方米，多布里奇 - 98 升/平方米，哈斯科沃 - 155 升/平方米，克尔贾利 - 151 升/平方米，斯利文 -111 升/平方米，旧扎戈拉 - 130 升/平方米，埃尔霍沃 - 123 升/平方米，奇尔潘 - 119 升/平方米），秋播作物100厘米土层的土壤水分储量已达到接近田间持水量的水平。

三月中旬（15-20.03），保加利亚南部向日葵的播种农艺期开始，而在下旬中期（25.03–5.04）——多瑙河平原的播种期开始。