Растителна защита
електронно списание за растителна защита
семена, торове и земеделие
ISSN 2815-522X

六月份多年生种植园的农业技术活动

ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

日期 08.06.2026 | **期号** 6/2026 | **ISSN** 2815-522X | **语言** ZH
www.plant-protection.com/article/2427?lang=zh



六月，北半球上空的大气将逐渐过渡到典型的夏季模式。极地涡旋已显著减弱并基本瓦解，这意味着与春季月份相比，其对欧洲天气的影响将大为减小。对保加利亚而言，这意味着天气将主要为温暖且时常炎热，但伴有该季节典型的午后雷阵雨。

来自南方的较热空气与来自西北的较冷海洋波动扰动相结合，将导致不稳定时期、雷暴和短暂降温，尤其是在保加利亚西部和山区。

总体而言，预计本月将比气候平均值更为温暖，从月初起便会有初夏之感，到月底，该国可能会受到今年首次严重热浪的影响。

气温将逐渐升高。早晨气温将在11°C至16°C之间，最高气温将达到25°C至30°C。在多瑙河平原和上色雷斯低地，不排除出现首次更显著的夏季高温，气温可达31°C至32°C左右。

在月中旬左右，可能会有一股冷锋过境，带来短暂但强烈的降水和雷暴。部分地区还可能降下冰雹，这是夏季初期的典型现象。

在第二个十天期间，大气将保持活跃。预计下午积雨云频繁发展，尤其是在保加利亚西部和中部。天气将是典型的六月天气——温暖的早晨，炎热的午后，以及一天结束时出现的局部风暴。降水不会很普遍，但在某些地方，短时间内降水量可能很大。

最低气温将在13°C至18°C之间，白天气温则在27°C至33°C之间。在保加利亚南部的某些地区，特别是在持续的南向平流期间，气温可能接近35°C。在黑海沿岸，天气将更为稳定，日照更多，降水风险较低。

月底，天气将呈现出更持久的夏季特征。南欧和巴尔干地区将建立更稳定的反气旋环流模式，这将限制降水并推高气温。气温将高于该时期的平均值。最低气温将在15°C至20°C之间，最高气温则在30°C至35°C之间。在该国最温暖的地区，不排除气温达到36°C至37°C。这很可能是我们经历本季首次更持久的夏季热浪的时期。

在果树苗圃中

苗床每分地施用6-8公斤硝酸铵或等量的其他氮肥，并进行松土。必要时进行灌溉。

母本园每分地施用10-15公斤硝酸铵或等量的其他氮肥，并进行培土。必要时，在培土前进行灌溉。

在苗圃中，进行除芽以促进嫁接植株的正常生长。砧木和苗圃应准备就绪，以备芽接。

在果园中

需进行监测，确保绑缚物不会勒入高接果树和野生树型的枝条中，必要时及时放松。从砧木上长出的竞争枝必须及时去除。

ISSN 2815-522X

对新栽植的树木进行定期松土。必要时浇水。在第二个十天之后，对幼龄果园每分地施用15-20公斤硝酸铵或等量的其他氮肥，并进行浅耕。

当整形为棕榈叶形时，当主枝总长度达到第一层2-2.5米、第二层1.5-2米、第三层1米时，将其向下弯曲。对于生长较弱的树，与水平面成45-50°角放置；对于生长旺盛的树，则成45-45°角。当一层中的主枝长度不同时，仅将强壮者弯曲，而将弱者保留生长，稍后再进行额外弯曲。

对桃树继续进行人工疏果。

在有灌溉保障的地区，进行绿肥作物的播种。

cherries

开始大量采收甜樱桃和酸樱桃。

在草莓园中

定植最后一批存放在冷藏库中的草莓苗。

对幼龄和新定植的草莓园继续进行除草养护。必要时进行灌溉。

strawberries

采收继续进行。不要在一天中的炎热时段或露水存在时进行采摘。供鲜食的草莓应连同果萼一起采摘。

在较温暖的地区，采收最后一批果实后，立即收集并移除稻草。每分地施用8-10公斤硝酸铵或等量的其他氮肥，并进行采后首次耕作。如需灌溉，应在施肥前进行。

在树莓园中

进行定期耕作。必要时浇水，在结果园中，继续清理行间非常弱小和多余的根蘖。保持铁丝支架结构的稳固。

raspberries

在部分地区，六月中旬左右，早熟品种开始采收果实。当果实开始成熟时，将蜂群转移到其他种植园，但距离不得少于5公里。

在黑加仑园中

根据灌溉、降雨和杂草情况，对扦插生根床的土壤进行2-3次耕作。对幼龄和结果园均进行定期耕作。

blackcurrant

在月中左右，一些较温暖地区开始采收果实。

在种植其他作物的园地中

继续进行柠檬砧木的带生长芽嫁接。

继续对石榴、无花果和沙棘的露地插条进行生根养护，苗圃需定期松土和浇水。进行必要的杂草防除处理。

临近月底，使用柿树的芽对去年未嫁接的砧木进行带生长芽的芽接。

继续将猕猴桃藤蔓绑缚到支撑桩上。施入为猕猴桃确定的年度氮肥用量的最后三分之一。清理猕猴桃主茎上的侧枝，以刺激其发育和整体整形。将其整成T字形。

在葡萄园中

vineyard

在未生草的葡萄园中进行土壤耕作，并应用杂草防除措施。耕作的目标是消灭杂草和打破土壤板结层。进行浅耕，深度为8-10厘米。耕作次数取决于杂草侵扰程度和降雨量。使用中耕机和旋转锄进行机械耕作。

在开花期间，不应进行此类活动：土壤耕作、灌溉等，这些活动会导致空气湿度增加和温度降低。

为防除匍匐冰草、田旋花和野燕麦等多年生杂草，可使用含有草甘膦活性成分的除草剂，例如Gligol 36 SL或Fast 36 SL，浓度为500/1000毫升/分地。

当匍匐冰草的茎长到20-30厘米时进行喷洒。它们会在15-25天内逐渐死亡。当田旋花的茎长到40-60厘米时进行喷洒。在7-10天内，它们会完全死亡。在田旋花开花期进行喷洒。

在幼龄葡萄园和结果葡萄园中进行夏季修剪作业。

对五月份未进行摘心的新梢进行摘心。对剩余的新梢进行环剥，只保留环剥口上方的梢尖，该梢尖必须进行引缚并绑到支撑铁丝上。还需进行第二次树干除芽、葡萄园中的新梢穿引和绑缚、低干和中干整形中的落蔓，并仔细放松绿枝嫁接新梢上的绑缚物。

在结果葡萄园中，进行新梢的穿引和绑缚，以及低干和中干整形中的落蔓。

对结果母蔓进行环剥。该操作包括从结果母枝、绿色新梢或主蔓上剥去一圈树皮，宽度为2-5毫米。使用专门的环剥工具进行环剥。必须遵守几个重要条件：应在开花后12-15天、浆果大小如豌豆时进行；对于按居约式整枝修剪的葡萄树，应在结果母枝水平部分的弯曲处之后环剥。对于主干整形的葡萄树，环剥口应做在结果母枝的基部。同一棵葡萄树每3-4年环剥一次。

进行疏穗、疏序和疏粒。

当坐果率非常高时，需去除多达总粒数40%的果粒。主要去除未受精的、小的和畸形的果粒。此操作应在一天中的凉爽时段进行，非常小心，避免过度触碰，且不要擦掉葡萄果粒上的果粉。

对母本区的新梢进行环剥和绑缚。

在葡萄扦插生根床中，疏松土壤板结层，清理露地根，并对葡萄苗进行施肥。

当新梢上出现第一根卷须时，进行露地根的清理。厩肥和矿质肥料的用量通常分别为：每分地1000-1500公斤厩肥，3-4公斤硝酸铵，5-10公斤过磷酸钙，以及3-6公斤钾盐或其他钾源。