Растителна защита
електронно списание за растителна защита
семена, торове и земеделие
ISSN 2815-522X

'七月永久作物农艺活动'

ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

日期 05.07.2026 | **期号** 7/2026 | **ISSN** 2815-522X | **语言** ZH
www.plant-protection.com/article/2439?lang=zh



七月将盛行晴朗炎热的天气，期间会穿插短暂的雷暴不稳定期。降水量分布不均——许多地区将长时间无雨，而其他地区局部暴风雨可能在短时间内带来大量降水。当前大气信号表明，七月的温度有可能略高于气候正常值，尤其是在下半月。

在本月上旬，预计七月最初几天将出现一段不稳定且略为凉爽的天气，这是由一股冷空气锋面过境全国所致。保加利亚大部分地区将出现雷暴、降水和冰雹，西北风将增强。7月5日至7日之后，大气将趋于稳定，晴天时数将占主导，气温将逐渐上升。最低气温将在15至20°C之间，白天气温将达到30°C至35°C，在多瑙河平原和上色雷斯低地最温暖的地区不排除出现约36°C的温度。

在月中旬，出现较长高温时段的概率增加。最高气温将在33°C至38°C之间，在保加利亚北部和色雷斯低地的某些地区，可能暂时达到39°C。

尽管以晴朗天气为主，但在该时期末期，不排除一股弱大气扰动过境，可能在西部地区和山区引发短暂雷暴。这些雷暴将是局部性的，但在某些地方可能较为强烈，并伴有强风阵风和冰雹。

本月的最后十天将保持其典型的夏季特征。预计将有较长时间的晴朗时段，保加利亚东部和黑海沿岸地区的降水概率最低。在西部和山区，将具备午后积雨云形成的条件，但降水将主要是局部性的。最低气温将在17°C至22°C之间，最高气温将达到32°C至37°C，在全国最炎热的地区，某些日子不排除出现约39°C至40°C的温度。

在果树苗圃中

定期对播种苗床进行浇水和耕作，以确保获得尽可能高比例的标准化砧木材料。母本园进行灌溉，必要时进行培土。

为确保芽接植株的良好发育条件，在第二年苗圃中，必要时进行除萌。特别是梨树，需定期耕作和灌溉。

在第一年苗圃中，开始进行砧木嫁接。未成活的芽接砧木进行补接。芽接后约两周，检查绑扎物。已勒入的予以松解。

在果树种植园中

继续进行棕榈叶形整枝过程中主枝的拉枝工作。

通过灌溉，将土壤湿度保持在田间持水量（FC）的70%以上。

使用圆盘耙、中耕机、旋耕机和带偏置段的旋耕机，保持行间和行内土壤表面的耕作状态并无杂草，如果植株间的区域未进行生草化处理的话。

甜樱桃和酸樱桃的采收工作继续进行。



杏和桃的大规模采收开始。

在草莓种植园中

继续对新建立的草莓种植园进行灌溉管理，特别是对六月栽植的草莓园。

在果实采收已结束的低洼和较温暖地区，收集、清除并焚烧稻草。



在较高和较凉爽的地区继续进行果实采收。

在清除稻草后，对种植园进行灌溉和耕作，此前已按每千平方米10-12公斤硝酸铵或同等浓度的其他氮肥进行施肥。

用于生产栽植材料的母本园进行灌溉，按每千平方米15-20公斤硝酸铵施肥，并进行松土。不用于采集栽植材料的种植园中的匍匐茎予以剪除。

确定新的草莓种植区域，并为秋季露地栽植做好准备。在深耕之前，按每千平方米施用2-4吨农家肥、60-80公斤过磷酸钙和20-30公斤硫酸钾。

在树莓种植园中

继续对新种植园进行灌溉和耕作管理。

结果种植园进行灌溉和耕作。灌溉定额为每千平方米50-60立方分米。



进行果实的大规模采收。

对树莓母本园进行管理——灌溉和耕作，以确保获得最大量的栽植材料——根蘖苗。

对种植园进行检查，清除其他品种的混杂植株，剪除已结果的衰老枝条，收集并焚烧。

在黑加仑种植园中

继续对生根苗床进行管理。对土壤进行灌溉和耕作。在幼龄和结果种植园中，不允许出现杂草。种植园施用氮肥（年施用量的1/3）。



进行果实的大规模采收。采收过程中，标记其他品种的混杂植株以便日后挖除，以及病株和弱株。采收后，剪除折断的、发育不良的和多余的枝条。

在其他作物的种植园中

标记所需的无花果品种和类型，用于获取插条。

从猕猴桃、月桂、黑果越橘、沙棘和石榴获取插条，用于在人工喷雾温室中进行生根。

插条进行整形，并用吲哚丁酸溶液处理5秒。在人工喷雾温室中，将其置于由两份珍珠岩和一份泥炭组成的基质中处理。

开始将高加索柿砧木嫁接柿树品种，以及将猕猴桃实生苗嫁接栽培品种。

继续将猕猴桃藤蔓绑缚到铁丝棚架上。进行猕猴桃的夏季修剪。

对枣树和阿月浑子进行芽接，采收无花果果实。



接近月末，沙棘和黑果越橘果实的采收开始。

在葡萄园中

七月气温显著升高，由于蒸腾作用加剧和浆果旺盛生长，葡萄植株对水分的需求增加。

这就要求特别注意及时、高质量地完成土壤耕作和灌溉，在有需要的地方进行。灌溉时间由根系分布层的土壤湿度决定，该湿度不应低于田间持水量（FC）的70%–75%。



灌溉时间也可以通过葡萄藤上的一些外部特征来确定，如生长停止和新梢顶端变直、最下部叶片过早黄化以及叶缘焦枯。葡萄园的灌溉定额为每平方米50至100升。

七月在结果葡萄园中要进行的最重要的绿色操作是副梢去除（打副梢）和新梢摘心（打顶）。

副梢去除包括完全或部分去除主梢节位上由夏芽长出的副梢。这一操作对于鲜食葡萄品种和生长旺盛的葡萄园是必须的，因为在这些地方容易造成严重遮荫以及病虫害的发生。最正确的做法是保留副梢基部4–5片叶进行副梢去除。在生长旺盛的品种中，特别是在棚架整形方式下，某些情况下完全去除部分副梢是有益的，以避免葡萄果穗的遮荫。

新梢摘心包括去除新梢的生长顶端，连同5–8片未充分发育的叶片。对于酿酒和鲜食葡萄品种，在新梢生长减缓后进行。高干整形的葡萄园以及生长弱至中等的棚架葡萄不进行摘心。这一措施对于中等干高或近地面整形的生长旺盛葡萄园至关重要。摘心后，鲜食葡萄品种的新梢上必须至少保留12–15片叶在果穗之上，酿酒品种保留10–12片。

在母本葡萄园中还进行下一次副梢去除和绿色新梢的绑缚。在生根苗床中，进行土壤耕作和除草。进行灌溉和施肥。

'