Растителна защита
електронно списание за растителна защита
семена, торове и земеделие
ISSN 2815-522X

8月——气温偏高，降水接近当月正常水平

Растителна Защита

日期 03.08.2026 | **期号** 8/2026 | **ISSN** 2815-522X | **语言** ZH
www.plant-protection.com/article/2446?lang=zh



八月份，农业气象条件将取决于高于气候正常值的气温以及接近当月正常水平的降水量。

八月初，农作物将在炎热天气下生长发育，在多瑙河平原的部分地区以及南部部分区域，还将面临土壤水分不足的情况。七月降水分布不均。七月底，在保加利亚东北部和上色雷斯低地部分地区（舒门 - 123升/平方米，锡利斯特拉 - 89升/平方米，多布里奇 - 69升/平方米，瓦尔纳 - 90升/平方米，普罗夫迪夫 - 73升/平方米），录得了高于正常水平的降水和50厘米及100厘米土层良好的土壤水分储量。

在本月最初几天，预报的极端高温（最高可达38-39°C或以上）将扰乱农作物正常的生理过程，并对晚季蔬菜作物和晚熟玉米杂交种的开花和受精产生不利影响。

根据播种日期和早熟性的不同，早熟玉米杂交种将进入从乳熟期到蜡熟期的过渡阶段，中晚熟品种则处于籽粒灌浆期。在农业技术期内播种的向日葵将处于籽粒充实阶段。

高温和预报的无降水天气将限制大田作物真菌病害的发生，但灌溉条件下种植的作物除外。

在果园和葡萄园中，建议监测螨虫、果实蛀虫和蛾类的存在情况。

预计在第一个十天期末，气温将短暂下降，伴有阵雨，并改善第二茬作物和晚熟玉米杂交种生长的条件。在该十天期内，较早熟的玉米杂交种将经历乳熟期并过渡到蜡熟期，中早熟品种则进行籽粒灌浆。在向日葵方面，多瑙河平原的部分地区和该国南部地区将观察到成熟期的开始。



保加利亚早熟鲜食葡萄品种“超级早博加尔”的采收于2026年8月初开始。首次大规模葡萄采收活动在普罗夫迪夫州的塔塔雷沃村启动。该品种于1961年由普列文葡萄种植与酿酒研究所通过意大利亚和扬塔尔品种杂交培育而成。该品种的葡萄成熟早（八月初）且均匀，可实

ISSN 2815-522X

现一次性采收。在完全成熟时，“超级早博加尔”的糖分积累可达15%至20%，并伴有适度的酸度平衡（5-6克/升）。

在此期间，早熟鲜食葡萄品种（阿米拉、超级早博加尔、普列文、梅奇塔、米斯凯特早、黑珍珠等）将达到消费成熟度。

在第二个和第三个十天期内，预报的气温接近或高于气候正常值，将加速晚季农作物的最终发育阶段。在第二个十天期末，平原地区的向日葵将普遍达到技术成熟期；在第三个十天期末，中晚熟玉米杂交种将完成其发育过程。

在八月第三个十天期，预报降水概率增加，这将改善上层土壤的水分状况，并有利于进行深耕和计划播种冬油菜田块的播前处理。在该十天期内，冬油菜的适宜播种期开始。

八月份的气象条件将限制真菌病害的发展，但蔬菜作物、果树和葡萄藤上的白粉病除外。本月，第二代果实蛀虫的有害活动仍在继续。预计螨虫种群数量将增加。



在葡萄园中，有必要监测欧洲葡萄蛾第三代毛虫的出现情况和密度

如有必要，应在一天中较凉爽的时段（气温低于25°C）进行植物保护喷施，并选用与作物成熟期相适应的安全间隔期的产品。

更多相关主题：

八月葡萄园的植物保护管理